

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

САНДРА®

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Сандра®

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические

Состав на одну таблетку.

В препарате содержатся настойки гомеопатические матричные, соответствующие первому десятичному разведению и субстанции:

Активные компоненты:

Aconitum soongaricum – D1 - 2,3 мг

(Аконитум сунгарикум)

Verbascum densiflorum – D1 - 2,3 мг

(Вербаскум денсифлорум)

Alchemilla vulgaris – D1 - 2,3 мг

(Альхемилля вульгарис)

Echinacea purpurea – D1 - 2,3 мг

(Эхинацея пурпурэа)

Mentha piperita – D1 - 2,3 мг

(Мента пиперита)

Daphne mezereum (Mezereum) – D1 - 2,3 мг

(Дафнэ мезэрэум (Мезэрэум))

Apis mellifica (Apis) – D1 - 2,3 мг

(Апис меллифика (Апис))

Atropa bella-donna (Belladonna) – D1 - 2,3 мг

(Атропа белла-донна (Белладонна))

Bryonia dioica – D1 - 2,3 мг

(Бриония диоика)

Hydrargyri dichloridum - 0,00025 мг

(Гидраргир и дихлоридум)

Вспомогательные вещества:

Сахароза (сахар-рафинад) - 225,55 мг

Желатин - 1,25 мг

Кальций стеариновокислый (кальция стеарат) - 2,5 мг

Масса таблетки – 250 мг

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с риской с одной стороны и фаской с двух сторон от белого до светло-желтого цвета с более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Для профилактики и в составе комплексной терапии в качестве симптоматического средства при «простудных» заболеваниях (ОРВИ) и гриппозных состояниях (лихорадка, общая слабость, головная боль) с целью повышения неспецифической сопротивляемости организма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период лактации

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Одну таблетку препарата помещают под язык и держат во рту до полного растворения. Для лечения в первые 2-3 дня применяют по 1 таблетке каждые 2 часа (7-8 раз в сутки). После снижения температуры в течение последующих 2-3 дней используют по 1 таблетке 4 раза в сутки. Курс лечения 5-6 дней.

Для профилактики в период вспышки ОРВИ препарат принимают по 1 таблетке 4 раза в день.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При применении препарата взаимодействие с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Информация для больных сахарным диабетом: одна таблетка препарата содержит 225,55 мг сахарозы (сахара-рафинада), что соответствует 0,019 ХЕ (хлебных единиц). Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска

Таблетки подъязычные гомеопатические.

По 10 или 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

3 контурные ячейковые упаковки № 10 или 1 контурную ячейковую упаковку № 30 вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель/Организация по приему претензий от потребителей:

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР».

117216, Россия, г. Москва, ул. Грина, 7. Тел/ факс: (495) 388-47-00.